

03 乳がんレジメン登録一覧

2022/10/8現在

レジメン名	薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考
FEC100	エピルピシン塩酸塩	100mg/m ²	点滴静注	15分	d1	21日間	
	シクロホスファミド水和物	500mg/m ²		30分	d1		
	フルオロウラシル	500mg/m ²		5分	d1		
FEC75	エピルピシン塩酸塩	75mg/m ²	点滴静注	15分	d1	21日間	
	シクロホスファミド水和物	500mg/m ²		30分	d1		
	フルオロウラシル	500mg/m ²		5分	d1		
術前・術後 EC E:100mg/m ²	エピルピシン塩酸塩	100mg/m ²	点滴静注	15分	d1	21日間	
	シクロホスファミド水和物	600mg/m ²		30分	d1		
進行・再発 EC E:60mg/m ²	エピルピシン塩酸塩	60mg/m ²	点滴静注	15分	d1	21日間	
	シクロホスファミド水和物	600mg/m ²		30分	d1		
T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	初回：90分 2回目以降：30分	d1	21日間	術後補助の場合 14クール
乳がんPTX175mg/m ²	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	180分	d1	21日間	
乳がん3週nab-PTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	点滴静注	30分	d1	21日間	
術前・術後 DTX75mg/m ²	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	21日間	
再発 DTX60mg/m ²	ドセタキセル	60mg/m ²	点滴静注	60分	d1	21日間	
乳がんwPTX(3投1休)	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1.8.15	28日間	
wPTX+BEV	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注	60分	d1.8.15	28日間	
	ベパシズマブ	10mg/kg	点滴静注	初回：90分→60分→30分	d1.15		
Eribulin	エリブリンメシル酸塩	1.4mg/m ²	点滴静注	5分	d1.8	21日間	
VNR	ビノレルビン酒石酸塩	25mg/m ²	点滴静注	5分	d1.8	21日間	
乳がんGEM	ゲムシタピン塩酸塩	1250mg/m ²	点滴静注	30分	d1.8	21日間	
Atezo+nab-PTX	アテゾリズマブ	840mg	点滴静注	初回：60分→30分	d1.15	28日間	
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	点滴静注	30分	d1.8.15		
乳がんHER(BS)	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1	21日間	
		2回目以降：6mg/kg		2回目以降：30分			
PER+HER(BS)+DTX	ベルツズマブ	初回：840mg	点滴静注	初回：60分	d1	21日間	
		2回目以降：420mg		2回目以降：30分			
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1		
DTX+HER(BS)	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	21日間	
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1		
		2回目以降：6mg/kg				2回目以降：30分	
PTX+HER(BS)	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴静注	180分	d1	21日間	
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1		
		2回目以降：6mg/kg				2回目以降：30分	
乳がんT-DXd	トラスツズマブ デルクステカン	5.4mg/kg	点滴静注	初回：90分→30分	d1	21日間	

03 乳がんレジメン登録一覧

2022/10/8現在

レジメン名	薬剤名（一般名）	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考			
dose dense EC	エビルピシン塩酸塩	90mg/m ²	点滴静注	15分	d1	14日間	ジーラスタ併用			
	シクロホスファミド水和物	600mg/m ²		30分	d1					
乳がんwPTX（毎週）	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1	7日間 12回				
乳がんTC	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1	21日間				
	シクロホスファミド水和物	600mg/m ²		30分	d1					
TC+HER	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1	21日間				
		2回目以降：6mg/kg		2回目以降：30分						
	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1					
	シクロホスファミド水和物	600mg/m ²		30分				d1		
TC+PER+HER	ベルツズマブ	初回：840mg	点滴静注	初回：60分	d1	21日間				
		2回目以降：420mg		2回目以降：30分						
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1					
		2回目以降：6mg/kg		2回目以降：30分						
	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注	60分	d1					
	シクロホスファミド水和物	600mg/m ²		30分				d1		
	PER+HER維持	ベルツズマブ	420mg	点滴静注	30分			d1	21日間	
		トラスツズマブ	6mg/kg	点滴静注	30分			d1		
wPTX+PER+HER	ベルツズマブ	初回：840mg	点滴静注	初回：60分	d1	21日間				
		2回目以降：420mg		2回目以降：30分						
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1					
		2回目以降：6mg/kg		2回目以降：30分						
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1.8.15						
wPTX+HER	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注	60分	d1.8.15	21日間				
	トラスツズマブ	初回：8mg/kg	点滴静注	初回：90分	d1					
		2回目以降：6mg/kg		2回目以降：30分						
Atezo+nab-PTX	ペムプロリズマブ	200mg	点滴静注	30分	d1	21日間	キイトルーダ(1クール：21日)を4クール分、アブラキサン(1クール：28日)を3クール分 計12週間をまとめてセットしてあります			
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100mg/m ²	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間				