

06 肺がんレジメン登録一覧

2022.1.27 現在

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤: ※' 体表面積1.25㎡未満:60mg/日 1.25~1.5㎡:80mg/日 1.5㎡以上:100mg/日 1日2回

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間	
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8.15		
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
	イリノテカン塩酸塩水和物 (リポソーム製剤)	180mg/㎡	点滴静注	90分 レボホリナート開始30分後より	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	全開	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
肺がんGEM	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間	
肺がんGS	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	60~100mg/日 ※'	経口	2回/日	d1夕-d15朝	21日間	※' 上記参照
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8		
nal-IRI+5-FU+LV	イリノテカン塩酸塩水和物 (リポソーム製剤)	70mg/㎡	点滴静注	90分	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
GEM+erlotinib	エルロチニブ	100mg/日	経口	1回/日	連日投与	28日間	
	ゲムシタビン塩酸塩	1000mg/㎡	点滴静注	30分	d1.8.15		