

20 血液内科レジメン

2023.3.13現在

| | レジメン名 | 薬剤名(一般名) | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与サイクル | 投与期間 | 備考 |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|--|--------|------|-------------------------|
| 骨髄異形 候群 形成 症 | アザシチジン点滴 | アザシチジン | 75mg/㎡ | 点滴静注 | 10分 | d1-d5 | 28日間 | |
| | アザシチジン皮下 | アザシチジン | 75mg/㎡ | 皮下 | | d1-d5 | | |
| | AZA 5-2-2 | アザシチジン | 75mg/㎡ | 皮下 | | d1-d7 | | |
| 慢性リン パ性 白血 病 | Alemtuzumab 3mg | アレムツズマブ | 3mg | 点滴静注 | 120分 | d1 | 1日間 | 導入用 |
| | Alemtuzumab 10mg | アレムツズマブ | 10mg | 点滴静注 | 120分 | d1 | 1日間 | 導入用 |
| | Alemtuzumab維持 | アレムツズマブ | 30mg | 点滴静注 | 120分 | d1.3.5 | 7日間 | Alemtuzumab投与開始から12週目まで |
| | FCR(1サイクル) | リツキシマブ | 375mg/㎡ | 点滴静注 | 初回:20mL/h(1時間)→100mL/h(1時間)→200mL/h 2回目以降:100mL/h(30分)→200mL/h(30分)→300mL/h | d1 | 28日間 | |
| | | フルダラビンリン酸エステル | 25mg/㎡ | 点滴静注 | 30分 | d2.3.4 | | |
| | | シクロホスファミド水和物 | 250mg/㎡ | 点滴静注 | 60分 | d2.3.4 | | |
| | FCR(2サイクル以降) | リツキシマブ | 500mg/㎡ | 点滴静注 | 100mL/h(30分)→200mL/h(30分)→300mL/h | d1 | 28日間 | |
| | | フルダラビンリン酸エステル | 25mg/㎡ | 点滴静注 | 30分 | d1.2.3 | | |
| | | シクロホスファミド水和物 | 250mg/㎡ | 点滴静注 | 60分 | d1.2.3 | | |
| | FMC | フルダラビンリン酸エステル | 25mg/㎡ | 点滴静注又は経口 | 60分 | d1.2.3 | 28日間 | |
| | | ミトキサントロン塩酸塩 | 8mg/㎡ | 点滴静注 | 30分 | d1 | | |
| | | シクロホスファミド水和物 | 200mg/㎡ | 点滴静注 | 60分 | d1.2.3 | | |
| 急性骨髄 性白血 病 | Vent+AZA | アザシチジン | 75mg/㎡ | 点滴静注/皮下 | 点滴静注:10分 | d1-7 | 28日間 | |
| | | ベネトクラクス錠 | 100→200→400mg | 経口投与 | day1:100mg day2:200mg day3以降:400mg | d1~継続 | | |
| | Vent+AraC | シタラビン | 20mg/㎡ | 点滴静注 | 24時間 | d1-d10 | 28日間 | |
| | | ベネトクラクス錠 | 100→200→400→600mg | 経口投与 | day1:100mg day2:200mg day3:400mg day4以降:600mg | d1~継続 | | |