

院外処方箋における問合せに関する合意書

医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター（以下「甲」という。）と一般社団法人朝霞地区薬剤師会（以下「乙」という。）は、薬剤師法第23条及び24条の取扱いについて、以下のとおり合意した。

（遵守事項）

- 第1条 先発医薬品において「変更不可」の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合は、処方薬を後発医薬品に変更できない。
- 2 「含量規格変更不可」又は「剤形変更不可」の記載がある場合は、その指示に従う。
- 3 処方変更は、各医薬品の適応及び用法用量を遵守した変更とすること。また、安定性や溶解性、体内動態等を考慮し、利便性が向上する場合に限る。
- 4 患者に十分な説明（服用方法、安定性、価格等）を行い、同意を得た上で変更する。
- 5 処方変更に係る医師への情報提供は、原則お薬手帳を利用することとし、次回受診時に患者から医師に直接見せるよう指導する。また、内容によっては、トレーシングレポートをFAXすることとする。

（問合せ）

第2条 乙に所属する医師が発行した処方箋にかかる問合せについては、別表の取扱いにより運用するものとする。

（附則）

第3条 本合意書に定めのない事項について疑義が生じたときは、その都度、甲・乙協議のうえ決定するものとする。

上記事項の合意を証するため、本合意書を2通作成し、甲・乙双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。

令和 4 年 4 月 28 日

(甲) 埼玉県朝霞市溝沼1340-1
医療法人社団武蔵野会TMGあさか医療センター
院長 飯田 惣 授

(乙) 埼玉県朝霞市西弁財1丁目10-21
一般社団法人朝霞地区薬剤師会
会長 畑 中 典 子

別表 1

<p>問合せの不要例（麻薬、抗がん剤、注射薬等は除く）</p> <p>①成分名が同一の銘柄変更</p> <p>例)・ジャヌビア錠 50mg → グラクティブ錠 50mg</p> <p>・ボナロン錠 35mg → フォサマック錠 35mg</p> <p>→ アレンドロン酸錠 35mg 「日医工」</p> <p>* 先発品間でも変更可（ただし、薬剤料が同額以下の場合のみ）。</p> <p>* 後発品から先発品への変更も可能（ただし、薬剤料の違いについて患者に十分説明し、了承を得た場合に限る）。</p> <p>* 各医薬品の適応が一致していることを確認する。</p>
<p>②剤形の変更（安定性、利便性の向上のための変更に限る）</p> <p>例)・ミヤ BM 散 → ミヤ BM 錠</p> <p>・リリカカプセル 75mg → リリカ OD 錠 75mg</p> <p>* 用法用量が変わらない場合のみ可。</p> <p>* 軟膏 ⇄ クリームの変更は不可。</p>
<p>③別規格製剤がある場合の処方規格の変更（安定性、利便性の向上のための変更に限る）</p> <p>例)・ 5mg 錠 1 回 2 錠 → 10mg 錠 1 回 1 錠</p> <p>・ 10mg 錠 1 回 0.5 錠 → 5mg 錠 1 回 1 錠</p> <p>* 適応症が変わる場合、疑義照会が必要。</p> <p>* 患者負担が増える場合には、患者の同意を得ること。</p>
<p>④アドヒアランス等の理由により処方薬剤を半割や粉碎、混合すること、あるいはその逆（規格追加を含む）</p> <p>例)・ワー ファリン錠 1mg 2.5 錠 → ワーファリン錠 1mg 2 錠</p> <p>ワーファリン錠 0.5mg 1 錠</p>
<p>⑤処方薬剤を服薬状況等の理由により、一包化調剤すること</p> <p>* 「アドヒアランス不良で一包化による向上が見込まれる」等、薬剤師が必要と判断した場合。不要と判断した場合には、1 包化を外すことも可能。</p> <p>* 必ず患者に服用方法並びに患者負担額について説明後、同意を得て調剤変更内容については、お薬手帳に記載し、次回、医師に直接見せるよう指導する。</p>
<p>⑥湿布薬や軟膏での規格変更に関すること（合計処方量が変わらない場合）</p> <p>例)・マイザー軟膏 0.05% 5g 2 本 → マイザー軟膏 0.05% 10g 1 本</p> <p>・セルタッチパップ 70（7 枚入り）6 袋 → セルタッチパップ 70（6 枚入り）7 袋</p>
<p>⑦患者の希望があった場合の消炎鎮痛外用貼付剤における、パップ剤⇄テープ剤の変更（成分が同じものに限る。枚数についても原則同じとする）</p> <p>例)・セルタッチパップ 70 → セルタッチテープ 70</p>
<p>⑧薬歴上継続処方されている処方薬に残薬があるため、投与日数を調整（短縮）して調剤すること（外用剤の本数変更も含む）</p> <p>例)・エリキユース錠 5mg 1 錠 朝食後 30 日分 → 20 日（10 日分残薬あり）</p> <p>・プロトピック軟膏 0.1% 5g 5 本 → 3 本（2 本残薬あり）</p> <p>* トレーシングレポート等を利用して情報提供を行う</p>
<p>⑨経腸栄養剤のフレーバー変更</p>