

01 大腸がんレジメン登録一覧

2026.3.2現在

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤: ※¹ 1.25㎡未満:80mg/日 1.25~1.5㎡:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日 1日2回

カペシタビン: ※² 1.36㎡未満:2400mg/日 1.36㎡以上:3000mg/日 1.66㎡以上:3600mg/日 1.96㎡以上:4200mg/日 1日2回

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考
FOLFIRI	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1	14日間	
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴静注	初回:60分→30分	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
OPT-11+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	60分	d1	14日間	
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	90分	d1		
大腸がんXELOX	カペシタビン	2000mg/㎡/日 ※ ²	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※ ² 上記参照
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
FOLFIRI+AFL	アフリベルセプト ペータ	4mg/kg	点滴静注	60分	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
FOLFIRI+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	60分(1000mg以上90分)	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
FOLFOX	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1	14日間	
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
FOLFOX+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	60分(1000mg以上90分)	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
大腸がんSOX	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80~120mg/日 ※ ¹	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※ ¹ 上記参照
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
FOLFOX+CET 【初回】	セツキシマブ	400mg/㎡	点滴静注	120分	d1	14日間	
		250mg/㎡	点滴静注	60分	d8		
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
FOLFOX+CET 【2回目以降】	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴静注	60分	d1.8	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
FOLFIRI+BEV(BS)	ベパシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		

01 大腸がんレジメン登録一覧

2026.3.2現在

テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤: ※¹ 1.25㎡未満:80mg/日 1.25~1.5㎡:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日 1日2回

カペシタビン: ※² 1.36㎡未満:2400mg/日 1.36㎡以上:3000mg/日 1.66㎡以上:3600mg/日 1.96㎡以上:4200mg/日 1日2回

レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考
FOLFOX+BEV(BS)	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1	14日間	
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	400mg/㎡	点滴静注	5分	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
IRIS+BEV(BS)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80~120mg/日※ ¹	経口	2回/日	d1タ-d15朝	28日間	※ ¹ 上記参照
	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg/㎡	点滴静注	90分	d1.15		
	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1.15		
mFOLFOXIRI+BEV(BS)	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1	14日間	
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	60分	d1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	オキサリプラチン	85mg/㎡	点滴静注	120分 ★同時に投与	d1		
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	点滴静注	46時間	d1		
FTD/TPI+BEV(BS)	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	70mg/㎡/日	経口	2回/日	d1-d5 d8-d12	28日間	
	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1.15		
S-1+BEV(BS)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80~120mg/日※ ¹	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※ ¹ 上記参照
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1		
XELOX+BEV(BS)	カペシタビン	2000mg/㎡/日 ※ ²	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※ ² 上記参照
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1		
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
SIRB(BS)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80~120mg/日※ ¹	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※ ¹ 上記参照
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1		
	イリノテカン塩酸塩水和物	150mg/㎡	点滴静注	90分	d1		
SOX+BEV(BS)	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	80~120mg/日※ ¹	経口	2回/日	d1タ-d15朝	21日間	※ ¹ 上記参照
	ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴静注	初回:90分→60分→30分	d1		
	オキサリプラチン	130mg/㎡	点滴静注	120分	d1		
CET+Encorafenib +Binimetinib【初回】	セツキシマブ	400mg/㎡	点滴静注	120分	d1	7日間	
	エンコラフェニブ	300mg/日	経口	1回/日	連日服用		
	ピニメチニブ	90mg/日	経口	2回/日	連日服用		
CET+Encorafenib +Binimetinib【2回目以降】	セツキシマブ	250mg/㎡	点滴静注	60分	d1	7日間	
	エンコラフェニブ	300mg/日	経口	1回/日	連日服用		
	ピニメチニブ	90mg/日	経口	2回/日	連日服用		
PER+HER【初回】	ペルツズマブ	初回:840mg	点滴静注	60分	d1	21日間	
	トラスツズマブ	初回:8mg/kg		90分			
PER+HER【2回目以降】	ペルツズマブ	2回目以降:420mg	点滴静注	30分	d1	21日間	
	トラスツズマブ	2回目以降:6mg/kg		30分			
結腸・直腸がんNivo+Ipi (MSI-high)	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	21日間	4コース終了後 維持療法へ移行
	イピリブマブ	1mg/kg	点滴静注	30分	d1		
結腸・直腸がんNivo維持 (MSI-high)	ニボルマブ	240mg	点滴静注	30分	d1	14日間	
Sotorasib+PANI	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	60分	d1	14日間	
	ソトラシブ	960mg/日	経口	1回/日	連日服用		