

## 50 婦人科がんレジメン登録一覧

2026.3.1 現在

	レジメン名	薬剤名(一般名)	投与量	投与方法	投与時間	投与サイクル	サイクル期間	備考	
卵巣がん	卵巣がんTC	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1	21日間		
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1			
	PLDC	ドキシソルピシン塩酸塩 (リポソーム製剤)	30mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	d1	28日間		
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1			
	DC	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1	21日間		
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1			
	卵巣がんCPT-11	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分	d1.8.15	28日間		
	卵巣がんGEM	ゲムシタピン塩酸塩	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間		
	PLD	ドキシソルピシン塩酸塩 (リポソーム製剤)	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分(90mg以上で120分)	d1	28日間		
	卵巣がんNGT	ノギテカン塩酸塩	1.5mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.2.3.4.5	21日間		
	TC+BEV		パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1	21日間	
			カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1		
			ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	90→60→30分	d1		
	卵巣がんBEV維持	ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	30分	d1	21日間		
	PLD+BEV		ドキシソルピシン塩酸塩 (リポソーム製剤)	40mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	90分(90mg以上で120分)	d1	28日間	
ペバシズマブ			10mg/kg	点滴静注	90→60→30分	d1.15			
NGT+BEV		ノギテカン塩酸塩	1.25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.2.3.4.5	21日間		
		ペバシズマブ	15mg/kg	点滴静注	90→60→30分	d1			
GEM+BEV		ゲムシタピン塩酸塩	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	d1.8.15	28日間		
		ペバシズマブ	10mg/kg	点滴静注	90→60→30分	d1.15			
子宮頸がん	TP	パクリタキセル	135mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	24時間	d1	21日間		
		シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d2			
卵巣腫瘍 胚細胞	BEP	シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1-d5	21日間		
		エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>		60分	d1-d5			
		プレオマイシン塩酸塩	30mg		30分	d1.8.15			
子宮体がん	子宮体がんTC	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	180分	d1	21日間		
		カルボプラチン	AUC5	点滴静注	60分	d1			
	AP	ドキシソルピシン塩酸塩	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	15分	d1	21日間		
	シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	d1				
その他	MTX異所性妊娠		50mg/m <sup>2</sup>	筋注		d1	3日間		
	5dayMTX		0.4mg/kg	筋注		d1-d5	14日間		